

Continúe con su dieta habitual si no hay indicación contraria por parte de su médico.




Si su cateterismo ha sido realizado por arteria radial debe mantener la mano en reposo absoluto las primeras 24h y en las 48h siguientes debe evitar esfuerzos violentos. Es normal que se produzca una leve hinchazón de la mano, para evitarlo, es recomendable mantener el brazo en cabestrillo (intentando mantener la mano por encima del codo) y movilizar los dedos.

En caso de sangrado debe comprimirse fuertemente la zona de la punción y acudir al centro sanitario más próximo para su valoración; al igual que si nota dolor intenso que no se controle con sus analgésicos habituales.

Si su cateterismo ha sido realizado por arteria femoral, deberá igualmente acudir al centro sanitario más cercano, si presenta cualquier contingencia como dolor intenso o sangrado.

Aunque esté de alta hospitalaria, aún no tiene el alta definitiva, nuestros compañeros de consultas y de atención primaria seguirán cuidando de Vd.



Nuestros teléfonos de contacto son:

951032672

951032041



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Comisión
Médica
EpS
Hospital Virgen de la Victoria

Andalucía
al máximo



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Andalucía
al máximo



RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON PROCEDIMIENTO DE CATETERISMOS

Unidad de Gestión del Corazón
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de
Málaga

Usted ha sido enviado por su médico para que se le realice un CATETERISMO CARDIACO.

Consiste en la exploración del corazón con catéteres (tubos flexibles y finos) introducidos a través de la arteria femoral o radial, con fines diagnósticos y terapéuticos.



Permite inyectar una solución de contraste y ver, mediante radiografías, si existe estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias, medir presiones de las cavidades cardiacas y realizar dilataciones valvulares o arteriales.

RECOMENDACIONES A LA FAMILIA

Puede acompañar al paciente hasta la entrada del Laboratorio de Hemodinámica, identificándose al personal de la Unidad e indicándole un nº de teléfono móvil.



PREPARACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

Debe permanecer en ayunas las 6 horas previas al cateterismo. Si lo han citado en horario de tarde, puede tomar un desayuno ligero.

Podría ser necesario que suspendiera algunos medicamentos varios días antes del procedimiento, como anticoagulantes orales (Sintrom®) o antidiabéticos orales (Metformina®), deberá consultarlo siempre con su médico.




Deberá traer de casa los medicamentos que este tomando.

Si lo desea puede venir con ambas ingles rasuradas de su casa.

COMO SE REALIZA LA PRUEBA

Sería conveniente venir acompañado de un familiar.



En caso de que su cateterismo diagnóstico se realice a través de la arteria radial, podrá volver a su domicilio tras unas horas de permanecer en nuestra Unidad.

En caso de que se realice por vía femoral, deberá permanecer ingresado, al menos 24h en nuestro hospital o en su hospital de referencia.

Es una intervención que se realiza con anestesia local y en ocasiones, si el paciente lo requiere, se le administrará un sedante ligero.

Durante todo el procedimiento estará acompañado de personal sanitario, cualquier duda o sensación no dude en comunicarla.

Tras la realización de la prueba se coloca un apósito que aplica una presión adecuada en la zona de punción, con el objetivo de evitar posibles sangrados.

Recuerde que tras la intervención no debe realizar movimientos bruscos con la pierna o el brazo donde se le ha realizado la punción.